



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	HB.YD.53.00
Yayın Tarihi	28.02.2020
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1 / 1

EKSTRAVAZASYON HASTA BİLGİLENDİRMESİ

Kemoterapi ilaçlarının damar dışına sızdığından şüphelenilen durumlarda yapılması gereken uygulamara ilişkin bilgiler

Kemoterapi tedavisi alırken bazı ilaçlar’ a yerleştirilen iğnenin damar dışına çıkması sonucu çevre dokuya sızabilir.Doku hasarı riskinin ve rahatsızlık hissini azaltmak için aşağıdaki önerilere uyunuz.

☐ Önümüzdekiiçinde günde kez dk süre ilekompres uygulayınız. Bu uygulamayatarihine kadar devam ediniz.

☐ Kolunuzu 1-2 yastıkla destekleyerek kalp seviyesinin üstünde tutmaya çalışınız.

☐ Doktor ya da hemşirenizin görüşünü almadan bu bölgeye krem, losyon ya da herhangi bir ilaç uygulamayınız.

☐ Bu bölgeye direk basınç uygulamayınız. Bandaj ya da sıkı sargı uygulamayınız.

☐ Bu bölgede aşağıdaki semptomlardan herhangi birisi olduğunda doktor ya da hemşirenize mutlaka bildiriniz:

- İlaç verilen damar etrafında kırmızılık, şişlik, yanma ya da ağrı hissi,
- Cilt üzerinde siyahlık ya da ciltte soyulma,
- Omuz, el ya da birlikte hareket güçlüğü,
- Etkilenen bölgede sıcaklık artışı